

INFÓRMESE. Cualquier persona puede contraer la viruela símica. Se propaga principalmente a través del contacto cercano de piel a piel.

REVÍSESE si tiene una erupción de piel. Si tiene nuevas erupciones de piel, lesiones de piel o llagas deben ser revisadas por un proveedor de atención médica. Hable con su pareja sobre cualquier síntoma de viruela símica.

LOCALICE un lugar para la prueba y vacunas para usted o su comunidad.

- No hay límite de pruebas. Hable con su médico o con el departamento de salud local.
- El suministro limitado de vacunas está priorizado para aquellos que actualmente están en mayor riesgo y para las comunidades donde el virus se está propagando.



**Encuentre más información,
pruebas y ubicaciones de vacunas:**
ncdhhs.gov/mpox



Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte • División de Salud Pública • Subdivisión de Enfermedades Transmisibles • NCDHHS es un empleador y proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. • 4/2023

Fotografías de portada: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Centro Nacional para Enfermedades Emergentes e Infecciosas Zoonóticas (NCEZID, por sus siglas en inglés), División de Patógenos de Alta Consecuencia y Patología (DHCPP), www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/clinicians/clinical-recognition.html • NHS England High Consequence Infectious Diseases Network, www.gov.uk/government/news/ukhsa-latest-findings-into-monkeypox-outbreak, The National Archives, contiene información del sector público con licencia de Open Government License v3.0



**Viruela símica: Que lo revisen.
Hacerse la prueba. Vacunarse,
si cumple con los requisitos.**



**Todos pueden hacer su parte para controlar
la propagación: Estamos juntos en esto.**

INFÓRMESE: Cualquier persona puede contraer la viruela símica. Se propaga principalmente a través del contacto cercano de piel a piel. Algunos ejemplos son:

Ejemplos de exposición a la viruela símica por contacto con alguien que tiene el virus

MAYOR EXPOSICIÓN:

- Contacto directo de piel a piel con erupciones infecciosas, costras o fluidos corporales
- Contacto sexual
- Otro contacto íntimo de piel con piel: como besos, masajes o abrazos

CIERTA EXPOSICIÓN:

- En multitudes donde la gente no usa mucha ropa y hay mucho contacto de piel a piel
- Al compartir bebidas, utensilios, cigarrillos, cigarrillos electrónicos, pipas, etc.
- Al compartir toallas, ropa de cama u otros artículos personales
- Al exponerse a gotitas respiratorias a través de contacto prolongado de cara a cara sin uso de mascarilla

EXPOSICIÓN IMPROBABLE:

- En multitudes donde la mayoría de las personas están vestidas, no hay mucho contacto de piel a piel
- Al darse la mano con alguien sin erupción de piel visible
- Al ir de compras en la tienda de comestibles o en el centro comercial
- Al viajar en autobús, tren o avión o al usar los baños públicos
- Al probarse ropa en una tienda

REVÍSESE si tiene una erupción de piel: Si tiene nuevas erupciones de piel, lesiones de piel o llagas deben ser revisadas por un proveedor de atención médica. Hable con su pareja sobre cualquier síntoma de viruela símica y esté al tanto de cualquier erupción o lesión nueva o inexplicable en cualquiera de sus cuerpos, incluyendo la boca, los genitales y el ano.



LOCALICE pruebas y vacunas para usted o su comunidad: No hay límite de pruebas. Hable con su médico o con el departamento de salud local: ncdhhs.gov/mpox
La vacuna está disponible en los departamentos y clínicas de salud locales. Averigüe si es elegible: ncdhhs.gov/mpox



Todos pueden hacer su parte para controlar la propagación: Estamos juntos en esto.
Más información: ncdhhs.gov/mpox

*Fotografías usadas con permiso.